

Maßnahmen zur Früherkennung von Krebserkrankungen

Für alle Personen mit LFS, beginnend ab klinischer oder genetischer Diagnosestellung, lebenslang
(Clin Cancer Res; 23(11); e38-45)

Kinder (Geburt bis 18 Jahre)	Erwachsene
<ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Untersuchung alle 3-4 Monate • Zeitnahe ärztliche Untersuchung bei medizinischen Problemen • Ultraschall Bauch und Becken alle 3-4 Monate • Falls Ultraschall Bildqualität unzuverlässig: Tumormarker im Blut • Jährlich MRT vom Kopf • Jährlich Ganzkörper MRT 	<ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Untersuchung alle 6 Monate • Zeitnahe ärztliche Untersuchung bei medizinischen Problemen • Jährlich MRT vom Kopf • Jährlich Ganzkörper MRT¹ • Jährlich Ultraschall Bauch und Becken • Untersuchung des Magendarmtraktes alle 2-5 Jahre ab 25. Lebensjahr • Jährlich hautärztliche Untersuchung <p><i>Zusätzlich für Frauen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Risikobewusstsein für Brustkrebs für Frauen • Klinische Brustuntersuchung zweimal jährlich ab 20. Lebensjahr • Jährliches Brust-MRT-Screening (von 20-75 Jahre)¹ <p>¹Die Brust-MRT sowie Ultraschalluntersuchung der Bauchorgane und des Beckens sollte sich mit der jährlichen Ganzkörper MRT abwechseln (mindestens ein Scan alle 6 Monate)</p>

Kontakt:

LFSA Deutschland e. V.
Claudia Sablowski
Erich-Ollenhauer-Str. 30
51377 Leverkusen

info@lfsa-deutschland.de
<https://www.lfsa-deutschland.de>
<https://fb.me/lfsagermany>

Früherkennungsempfehlungen

Für alle Personen mit LFS, beginnend ab klinischer oder genetischer Diagnosestellung, lebenslang
(Clin Cancer Res; 23(11); e38-45; Details: <http://clincancerres.aacrjournals.org/content/23/11/e38>)

Kinder (Geburt bis 18 Jahre)	Erwachsene
<ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Untersuchung alle 3-4 Monate, einschließlich Blutdruckmessung, Wachstumskurve und neurologischer Status • Sofortige Abklärung neuer Symptome • US Abdomen+Becken alle 3-4 Monate • Im Falle unzureichender US Qualität: Alle 3-4 Monate: Blutentnahme (Gesamt-Testosteron, Dehydroepiandrosteronsulfat und Androstendion) • Jährlich MRT-Schädel (zunächst mit Kontrast, danach ohne Kontrast, wenn vorherige MRT normal und keine neuen Aspekte) • Jährlich Ganzkörper MRT 	<ul style="list-style-type: none"> • Körperliche Untersuchung alle 6 Monate • Sofortige Abklärung neuer Symptome • Ganzkörper-MRT¹: Kopf bis Fuß, einschließlich Extremitäten • Jährlich MRT-Schädel (zunächst mit Kontrast, danach ohne Kontrast, wenn vorherige MRT normal und keine neuen Aspekte) • US Abdomen+Becken alle 12 Monate¹ • Obere Endoskopie und Koloskopie alle 2-5 Jahre (ab 25 Jahre) • Jährliche dermatologische Untersuchung <p><i>Zusätzlich für Frauen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Brustkrebs-Risikobewusstsein • Klinische Brustuntersuchung zweimal jährlich (ab 20 Jahre) • Jährliches Brust-MRT (20-75 Jahre)¹ • Risikominimierende bilaterale Mastektomie erwägen <p>¹Brust MRT/ US Abdomen+Becken mit jährlicher Ganzkörper MRT abwechseln (mindestens ein Scan alle 6 Monate)</p>

Kontakt:

LFSA Deutschland e. V.
Claudia Sablowski
Erich-Ollenhauer-Str. 30
51377 Leverkusen

info@lfsa-deutschland.de
<https://www.lfsa-deutschland.de>
<https://fb.me/lfsagermany>